



Anais do II Fórum de Iniciação Científica de Odontologia da UNISC  
Santa Cruz do Sul, v.2, n.2, out., 2021  
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/forumodonto>

## PERIODONTITE ULCERATIVA NECROSANTE (PUN) – RELATO DE CASO CLÍNICO

Douglas Henrique Oliveira<sup>1</sup>, Lucas V. Fischer<sup>1</sup>, Ricardo Sartori<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Graduandos do Curso de Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

- RS

<sup>2</sup> Docente do Curso de Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

- RS

**Introdução:** As doenças periodontais necrosantes têm como características clínicas, papila necrosada ou ulcerada, recobertas por uma pseudomembrana branco-amarelada/acinzentada ou um tecido necrosado, papila em cratera, sangramento espontâneo, dor e odor fétido, não se limitando apenas à margem gengival. Há duas formas dessa doença, a gengivite ulcerativa necrosante (GUN), e a periodontite ulcerativa necrosante (PUN). Ambas são manifestações de uma mesma doença, com características clínicas e etiologia semelhantes, o que as diferencia é a perda óssea e inserção clínica, características da PUN. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de um paciente com periodontite ulcerativa necrosante (PUN), descrevendo as características apresentadas e as medidas tomadas para o tratamento da doença. **Metodologia/Relato de caso:** Paciente do gênero masculino, 44 anos de idade, compareceu à clínica de odontologia da UNISC na disciplina de Periodontia II. Após anamnese foi constatado que o paciente havia sofrido AVC, tornando a higienização bucal prejudicada. Foram observados restos alimentares, inúmeras lesões de cáries, assim como odor fétido, sangramento espontâneo, perda de inserção clínica, profundidade de sondagem e nos exames radiográficos, perda óssea horizontal considerada. Foi então realizado exames periodontais para confecção do periograma, a partir deste, concluímos que se tratava de uma doença periodontal ulcerativa necrosante (PUN), perante ela, foi confeccionado um plano de tratamento adequado para a doença. Foram realizadas raspagens supragengivais e administração de medicamento como Metronidazol 50mg e Clorexidina a 0,12% para contenção e tratamento da patologia.

Departamento de Ciências da Saúde  
Curso de Odontologia  
XXIII Semana Acadêmica de Odontologia da UNISC



Anais do II Fórum de Iniciação Científica de Odontologia da UNISC  
Santa Cruz do Sul, v.2, n.2, out., 2021  
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/forumodonto>

**Resultados:** As raspagens supragengivais realizadas no paciente mostraram-se efetivas na diminuição inflamatória periodontal. No plano de tratamento, estava contemplado raspagens subgengivais nos dentes que apresentavam bolsas periodontais, entretanto pela limitada disponibilidade de horários da disciplina não pode-se realizar esses procedimentos num primeiro momento. Contudo, o paciente foi encaminhado internamente para outros horários de atendimento para dar continuidade no seu tratamento, a fim de estabelecer uma saúde bucal satisfatória.

**Conclusão:** O tratamento indicado para periodontite ulcerativa necrosante (PUN) deve se dar após todos os exames periodontais e radiográficos, para um correto diagnóstico e elaboração do melhor plano de tratamento. Assim, o tratamento possibilitou a melhora da saúde periodontal e autoestima do paciente, ao passo que a cada sessão compadecida foi perceptível a evolução e comprometimento com a sua saúde bucal.

**Palavras-chave:** Periodontia, Periodontite Ulcerativa Necrosante, Doença Periodontal.

Departamento de Ciências da Saúde  
Curso de Odontologia  
XXIII Semana Acadêmica de Odontologia da UNISC